

Ukončení izolace pacienta s onemocněním COVID-19

Algoritmus testování metodou PCR u nemocných s COVID-19 (PCR pozitivních)

Klinická kritéria hodnocení onemocnění COVID-19:

teplota $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu – pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak

Symptomatický pacient s klinicky závažným průběhem

Symptomatický pacient bez klinicky závažného průběhu

Asymptomatický pacient

Nařízená izolace v nemocnici

Nařízená izolace doma

Nařízená izolace doma

Přetrvávání klinických obtíží > 14 dnů

Ústup klinických obtíží, tj. 4 dny bez příznaků

Provedení PCR

Ukončení izolace nejdříve 14. den od prvního PCR+ testu, z toho minimálně 4 dny bez klinických příznaků, ukončuje se bez PCR testu
Pacient je považován za neinfekčního

Izolace na min. 14 dní od prvního pozitivního PCR testu

Izolace na 14 dní od prvního pozitivního PCR testu

PCR -

PCR +

Provedení testu na viabilitu (kultivace viru)

Kultivace negativní

Ukončení izolace
Pacient je považován za neinfekčního

Ukončení izolace nejdříve 14. den od prvního PCR+ testu, z toho minimálně 4 dny bez klinických příznaků, ukončuje se bez PCR testu
Pacient je považován za neinfekčního

Ukončení izolace 14. den bez PCR testu
Pacient je považován za neinfekčního