

# PODEZŘENÍ NA COVID-19 U SYMPTOMATICKÉHO PACIENTA

## ● klinické vyšetření

- objednání na čas
- oddělený “infekční” provoz
- v indikovaných případech návštěva u pacienta doma
- OOPP personál + pacient

## ● distanční péče

- nerizikový pacient na základě úvodní konzultace s lékařem, příznaky lehké infekce \*
- test v odběrovém místě či ordinaci po předchozím objednání

\* Stav pravidelně kontrolujeme prostřednictvím distančních konzultací k posouzení vhodnosti/načasování klinického vyšetření.

## **Indikace k testování SARS-CoV-2\***

- horečka, kašel, dušnost, pneumonie, bronchitis
- ztráta chuti, čichu
- symptomatický kontakt s covid + osobou (jakékoliv příznaky)
- zhoršení klinického obrazu chronického onemocnění (např. progresse dušnosti, apatie, zmatenost, oligurie,...)
- jakékoliv příznaky respirační infekce trvající déle, než 1 den
- průjem, bolesti hlavy, bolesti svalů, únava nevysvětlitelné jinak

**\* O indikaci rozhoduje ošetřující lékař.**

- **Antigenní test**

- [Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.](#)
- [Seznam antigenních testů, které budou uznávané v rámci členských států Evropské unie](#)

- **PCR test - konfirmační PCR dle aktuálního epidemiologického nařízení/dostupnosti**

**TEST pozitivní**

- zadání ISIN
- nařízení izolace

**Ambulantní terapie  
možná?**

- [indikace hospitalizace dle doporučeného postupu](#)
- [indikace MoAb?](#)

**Hospitalizace**

- kontrola u PL po dimisi
- dispenzarizace dle doporučení Následná péče

**TEST negativní**

- dif. dg
- při trvající suspekci na covid-19 opakované laboratorní vyšetření
- izolace min. 3 dny a 48 hod. bez příznaků

- **laboratorní, RTG vyšetření dle klinického uvážení**
- **symptomatická terapie viz [doporučený postup](#)**
- **izolace min. 14 dní, hygienický režim, ukončení dle platných epidemiologických opatření viz [doporučený postup](#)**
- **pravidelné distanční konzultace +/- klinické vyšetření ve vyhrazených ordinačních hodinách**
- **opakované hodnocení indikace k hospitalizaci viz [doporučený postup](#)**
- **v indikovaných případech domácí monitorace SpO2 pulzním oxymetrem**